

## CINTILOGRAFIA FÍGADO E VIAS BILIARES

**Radiofármaco:** disida-<sup>99m</sup>Tc

---

**Duração:** Separar **o dia todo** para a realização do exame. Eventualmente pode ser necessário realizar uma imagem após 24 horas da injeção.

---

**Como o exame é realizado:** O paciente é posicionado na câmara de cintilação. O radiofármaco é injetado na veia do paciente. São realizadas imagens durante 60 minutos. Após esta etapa, o paciente pode se movimentar. Depois, retorna para realizar novas imagens que dura cada uma, em torno de 15 minutos. Estas imagens tardias podem ser realizadas até 7 horas após a injeção venosa. Não é necessária a permanência do paciente na Medicina Nuclear durante o intervalo entre injeção e as imagens. Pode ser necessária a realização de imagem com 24 horas.

---

**Preparo:** Jejum de **4 horas até um máximo de 6 horas** antes do exame. Em caso de pacientes que já realizaram a retirada da vesícula biliar, não é necessário jejum. O exame não poderá ser realizado se o jejum for maior que 6 horas. Não é necessária a suspensão de medicamentos de uso diário.

---

### **INFORMAÇÕES GERAIS**

- Trazer o pedido médico e exames anteriores (de sangue e de imagem).
- Capacidade máxima do equipamento: 130 kg [peso do paciente].
- Pacientes abaixo de 18 anos devem vir acompanhados de um adulto.

- EM CASO DE GRAVIDEZ (SUSPEITA OU CONFIRMADA) OU EM CASO DE AMAMENTAÇÃO, NÃO REALIZAR O EXAME.
- **Chegar 20 minutos antes do horário do exame.**
- Resultado do exame: dois dias úteis, após as 16h00min.