

## **CISTOCINTILOGRAFIA DIRETA**

**Radiofármaco:** pertecnetato  $^{99m}\text{Tc}$

---

**Duração:** Separar **3 horas de seu dia** para a realização do exame.

---

**Como o exame é realizado:** Será feita uma sondagem vesical antes da obtenção das imagens. Nesta etapa há o incômodo da colocação da sonda vesical. Após a sondagem, o paciente é posicionado na câmara de cintilação. O radiofármaco é então injetado na sonda vesical (o paciente não sentirá nada) junto com soro fisiológico. São realizadas imagens durante 60 minutos ou até o paciente sentir vontade de urinar. Em seguida, imagens do esvaziamento vesical são obtidas.

---

### **Preparo:**

- Não é necessário jejum ou suspensão de medicamentos de uso diário.
- 

### **INFORMAÇÕES GERAIS**

- Trazer o pedido médico e exames anteriores (de sangue e de imagem).
- Capacidade máxima do equipamento: 130 kg [peso do paciente].
- Pacientes abaixo de 18 anos devem vir acompanhados de um adulto.
- **EM CASO DE GRAVIDEZ (SUSPEITA OU CONFIRMADA) OU EM CASO DE AMAMENTAÇÃO, NÃO REALIZAR O EXAME.**

- **Chegar 20 minutos antes do horário do exame.**
- Resultado do exame: dois dias úteis, após as 16h00min.